

予防接種スケジュール(参考)

		接種方法	生後6週	2カ月	3カ月	6カ月	9カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	備考		
定期 予防 接種	ヒブ	皮下注射(不活化)																					
			生後2か月～7か月未満で接種開始し3回(27～56日の間隔をあけて)、3回目から7～13か月の間に追加1回																				
	小児肺炎球菌	皮下注射(不活化)																					
			1期:生後2か月～7か月未満で接種開始し3回(27日以上の間隔をあける)、3回目から60日以上あけて(1歳～1歳3か月の間に)追加1回																				
	四種混合	皮下注射(不活化)																					
			生後3か月～1歳で3回(20～56日の間隔をあけて)、3回目から1年～1年6か月の間に追加1回																				
	BCG	皮下注射(生)																					
			生後5か月～8か月未満で1回																				
	麻しん風しん混合(MR)	皮下注射(生)																					
		1期:1歳～2歳未満に1回 2期:小学校入学1年前の4月1日～入学する年の3月31日までに1回																					
水痘	皮下注射(生)																						
		1歳～1歳3か月で1回、1回目から6か月以上～1年未満に1回																					
日本脳炎	皮下注射(不活化)																						
		1期:3歳～4歳で2回[6～28日の間隔をあけて)、2回目からおおむね1年後に1回 2期:9歳の期間に1回																					
二種混合	皮下注射(不活化)																						
		2期:11歳の期間に1回																					
子宮頸がん	皮下注射(不活化)																						
		★平成25年6月14日より接種勧奨は差し控えとなっています																					
		サーバリックス(2価ワクチン) 1回目の1か月後に2回目、1回目の6か月後に3回目																					
		ガーダシル(4価ワクチン) 1回目の2か月後に2回目、1回目の6か月後に3回目																					
任意 接種	ロタウイルス	経口服用(生)																					
			生後6週～24週で2回(4週間以上あける)																				
			ロタリックス(2価)																				
			生後6週～32週で3回(4週間以上あける)																				
		ロタテック(5価)																					
B型肝炎	皮下注射(不活化)																						
		生後2か月～4週間隔で2回、1回目から20～24週後に1回																					
おたふく	皮下注射(生)																						
		1歳で1回、1回目から2～4年後に追加1回																					
インフルエンザ	皮下注射(不活化)																						
		生後6か月～12歳以下は2回(2週～4週の間)・13歳以上1回																					
		2種類のワクチンがあり、どちらも初回は14週6日までに接種することが推奨されています																					
		確実な免疫をつけるために、1回目から2～4年後に追加接種を受けるのが有効です																					
		毎年1～2回 10～11月頃に接種開始																					